


Potentiel métallique de trois permis de recherches armoricains : des projets aurifères au service de la transition ?

SystExt · août 2026

ANNEXE



— Faille
- - - Faille supposée

■ Q, Filons de quartz

■ Colluvions indifférenciées

■ R-C, Colluvions limoneuses de versants

■ LP, Limons des plateaux

■ CA, Colluvions

■ i, Argiles d'altération

■ Fz, Alluvions

■ iF, Altérites très ferruginisées (faciès minières), para-autochtones, (Paléocène supposé)

■ ps, Pliocène

■ pr, Pliocène, faciès redoniens

■ d7b, Formation des Schistes à nodules de la Vallée (Faménien supérieur)

■ d3-4, Formation des Calcaires d'Erbray et de Pont-Maillet (Emsien-Eifélien)

■ d2-3, Formation des Calcaires à Nowakia acuaría et Viriatellina (Praguén-Emsien)

■ d2, Formation des Schistes et Calcaires de Vern-d'Anjou et d'Angers (Praguén moyen)

■ d1-2, Formation des Grès à Platyorthis monnieri (Lochkovien supérieur-Praguén inférieur)

■ s2RB, Formation de Renac et Bois-Neuf, schistes à sphéroïdes (Wenlock)

■ s1-2RB, Formation de Renac et Bois-Neuf, schistes gris sombre (Llandovéry-Wenlock)

■ s1-2RB, Formation de Renac et Bois-Neuf, phtanites (Llandovéry-Ludlow)

■ tf, Arkoses et tufs à végétaux (Paléozoïque, Dévonien supérieur?)

■ Kôâ, Formations volcaniques indifférenciées (Paléozoïque, Dinantien ?)

■ o2PB, Formation de la Pile et la Boserie, grès verts psammitiques et schistes noirs (Arénig moyen-supérieur)

■ o2Ga, Formation du Grès armoricain (Arénig)

■ o2PR, Formation de Pont-Réan, siltites rouges ou vertes, grès fins et argilites ocre (Arénig)

■ o3-4bGA, Formation du Grand-Auverné, membre supérieur des Grès d'Angrie, grès et quartzites blancs

■ o3-4aGA, Formation du Grand-Auverné, membre inférieur des Schistes de Trélazé, argilites silteuses ardoisières

■ o3-4?PB, Formation de la Pile et la Boserie, pélites silteuses sub-ardoisières à ardoisières (Llanvirn-Llandeilo)

■ o4-5aM, Formation de Saint-Marcel, grès et grès-quartzites blancs (Llandeilo-Caradoc inférieur)

■ o5M, Formation de Saint-Marcel, Grès à Onnia grenieri (Caradoc inférieur)

■ o5-6M, Formation de Saint-Marcel, grès psammitiques et quartzites (Caradoc-Ashgill?)

■ æã3CI, Orthogneiss de St-Clément-de-la-Plac

■ s1-2H, Formation des Ampélites du Houx (Llandovéry-Wenlock)

■ o5-6Pe(sh), Groupe de Saint-Perreux, argilites silteuses sub-ardoisières à ardoisières

■ o5-6Pe(g), Groupe de Saint-Perreux, Grès à Calymennella bayani

■ o5-6Pe, Groupe de Saint-Perreux indifférencié, schistes, grès (Schistes de Bouchemaine et Erigné)

■ b(?), Grès fins et siltites straticulés, verts (Brovérien?)

■ bMy(û,s), Formation de la Mayenne, quartzites, séricitoschistes, siltites (Briovérien)

■ bMy(cg), Formation de la Mayenne, conglomérats quartzeux de type Gourin (Briovérien)

■ bMy(s,g), Formation de la Mayenne, siltites et grès fins verts en alternance (Briovérien)

■ b-o2bBO, Groupe de Bains-sur-Oust, membre supérieur grés-conglomératique

■ b-o2BO, Groupe de Bains-sur-Oust indifférencié, siltites, grès feldspathiques, microconglomérats, grès quartzites

■ s2-3(ph), Formation des Schistes à sphéroïdes, phtanites (Wenlock-Ludlow)

■ s1Ch-P, Formations de La Chesnaie et de Poligné indifférenciées

■ o5-6RR, Formation de Riadan-Renazé, siltites à niveaux ardoisières (Caradocien-Ashgillien)

■ o5Cha, Formation du Châtelier, grès verts (Caradocien)

■ o3-4Tr, Formation de Traveusot, pélites silteuses ardoisières sombres (Llanvirnien - Llandeillien)

■ o2cGa, Formation du Grès armoricain, Membre supérieur, quartzites (Arénig)

■ o2bGa, Formation du Grès armoricain, Membre moyen, siltites argileuses (Arénig)

■ o2aGa, Formation du Grès armoricain, Membre inférieur, quartzites et niveaux ferrifères (Arénig)

■ ñMa, Formation des Mauges, micaschistes (méta-pélites et méta-grauwackes)

■ iã3, Microgranite à biotite (filons)

■ ã1, Leucogranite à muscovite (filons)

■ iã3Be, Microgranite de Bécon-les-Granits