


Potentiel métallique de trois permis de recherches armoricains : des projets aurifères au service de la transition ?

SystExt · août 2026

ANNEXE



PERMIS DE TARANIS

5 km

Faïlle

Faïlle supposée

Q, Filons de Quartz

Alluvions

C, Colluvions

S, Dépôts de versants soliflués (Weichsélien à Actuel)

Mz, Vases marines

j, Argiles

dépôt sableux (Pliocène à Quaternaire)

Lz, Zones lacustres (Holocène)

b, Schistes silteux, argileux et ampéliteux à graywackes (Briovérien)

bP, Poundingue de Gourin (Briovérien)

b-o2, Groupe de Bains-sur-Oust: microconglomérats, grès feldspathiques, siltites (Briovérien à Arénig)

o5b-6, Formation de Riadan-Renazé: schistes siltiteux, micacés et chloriteux (Caradoc sup.)

o5b-6G, Formation de Riadan-Renazé: Lentilles gréseuses et niveaux de grès feldspathiques ou de quartzites blancs (Caradoc sup à Ashgill)

o5-6, Formation de Saint-Marcel: siltstones grossiers à intercalations gréseuses (synclinal de Malestroït) - Caradoc à Ashgill - 196

o5a, Formation du Châtelier: grès verts micacés et quartzites blancs micacés (Caradoc inf.)

o3-5a, Formation d'Angers-Traveusot et de de Rochefort-en-terre : pélites et siltites subardoisières (Lanvirn à Caradoc inf.)

o2c, Formation du Grès Armoricaïn: quartzites fins à très fins, quartz-arénites, psammites en petits bancs blancs (Arénig)

o2b, Formation du Grès Armoricaïn: schistes subardoisières (Arénig)

o2a, Formation du Grès Armoricaïn: quartzites blanches ou beiges massives (Arénig)

o1-2U, Formation de Pont-Réan: membre de Tréal: volcanoclastites acides (Trémadoc à Arénig inf.)

o1-2B, Formation de Pont-Réan: membre de Montfort : schistes pourpres siltiteux et siltites micacées pourpres (Trémadoc à Arénig inf.)

o1-2P, Formation de Pont-Réan: membre de Montfort : poudingues (Trémadoc à Arénig inf.)

Br, Brèche silicifiée polygénique à quartz bréchique, grès géodique et hématite (Briovérien à Arénig)

ã1L, Granite orthogneissique calco-alkalin à alcalin des Landes de Lanvaux (Ordovicien : 474 +/- 8 Ma et 433 +/- 4 Ma)

o3-4S, Schistes de Saint-Perreux: Siltites argilo-gréseuses verdâtres ou rougeâtres (Lanvirn à Llandeillo sup.)

d3b, Schistes gris-verts (Emsien sup.)

s4, Formation de la Ville-Chauve: schistes tuffacés gris, lustrés et ferrugineux (Pridoli)

s4(Pht), Formation de la Ville-Chauve: phtanites (Pridoli)

s4G, Formation de la Ville-Chauve: grès grossiers (Pridoli)

s2-3, Formation des Schistes à sphéroïdes indifférenciée, ampélites, grès, siltites (Wenlock -Ludlow) - 133

s1-3(2), Formation de Renac: grès et siltites à lamines, schistes argileux (Llandovery sup.à Ludlow)

s1Q, Formation de la Chesnaie: quartzites ou grès-quartzites clairs (Llandovery inf.)

s1A, Formation de la Chesnaie: argilites silteuses, pélites (Llandovery inf.)

s1G(1), Formation de Poligné et de Gandouin : quartzites clairs à filonnets de quartz (Llandovery moy. à sup.)